

Formula bruta	Famiglia chimica	Codice CAS	Classe IARC	Codice EINECS
C2H3Cl	Organoalogenati	75-01-4	1	200-831-0

### Denominazione

Vinile cloruro

### Sinonimi

Chlorethene; Chloroethene; Chloroethylene; Cloretene; Cloroetilene; Cloruro di vinile; Ethene, chloro-; Ethyl carbamate; Ethylene monochloride; Ethylurethan; Etilene monocloruro; Monochloroethene; Monochloroethylene; Monocloroetilene; Rcra waste number u043; Trovidur; Un 1086; Vc; Vcm; Vinile (cloruro di); Vinyl chloride; Vinyl chloride monomer; Vinyl monomer; Cvm; Cloruro di vinile monomero

### Classificazione CE (CLP n.1272/2008)

### Regolamento REACH

Sostanza soggetta a restrizioni secondo l'Allegato XVII del regolamento REACH e successivi aggiornamenti.

### Organi Bersaglio

L'evidenza epidemiologica della cancerogenicit  umana del vinil cloruro deriva principalmente da due studi di coorte multicentrici di grandi dimensioni, uno realizzato in USA, l'altro in Europa. Questi studi hanno riguardato lavoratori di industrie che producevano vinil cloruro monomero, polivinil cloruro e prodotti derivati. Ulteriori informazioni sono fornite da studi di coorte di dimensioni minori. Entrambi gli studi hanno riscontrato un sostanziale incremento del rischio relativo di insorgenza dell'angiosarcoma del fegato nei lavoratori esposti. In entrambi gli studi, il rischio di angiosarcoma aumentava notevolmente con la durata dell'esposizione. Molteplici casi di angiosarcoma sono stati riportati in studi di dimensioni minori. In sintesi questi dati costituiscono la prova definitiva che il vinil cloruro provoca angiosarcoma epatico. Esistono evidenze pi  limitate per l'associazione con il carcinoma epatocellulare del fegato, il cui rischio   aumentato per quei lavoratori affetti dal virus dell'epatite o che fanno uso di alcol. Tra i lavoratori esposti al solo vinile cloruro monomero non vi   evidenza di insorgenza di tumore al polmone, riscontrata invece in lavoratori addetti alla lavorazione del pvc, in cui   presente un'esposizione a livelli elevati di polvere di pvc. Alcuni studi, infine, riportano una correlazione tra l'esposizione a vinil cloruro e l'insorgenza di tumori del tessuto connettivo e dei tessuti molli. I dati derivano da uno studio multicentrico realizzato nel Nord America, in cui si riscontrava un incremento del rischio con la durata dell'esposizione. Questi risultati non sono stati supportati dagli esiti dello studio multicentrico europeo.

### Utilizzo

Intermedio chimico per produrre polivinilcloruro e copolimeri vinilici, in varie sintesi organiche, come adesivo della plastica, nelle lavorazioni della gomma e della carta, usato anche come refrigerante.

### Elenco lavorazioni collegate

Lavorazioni	Letteratura	Campionamenti	Reg. patologie	SIREP
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, fognature, pozzi e cisterne.				X
Autisti.				X
Costruzione di arredamenti in materiale metallico, di casseforti, armadi corazzati, serrature e lucchetti di sicurezza, di lampadari, di carrozzine e passeggini per bambini, di serramenti in lega leggera.				X
Costruzione di mobili ed arredamenti.				X
Demolizione di macchinari, apparecchiature e attrezzature metalliche.				X
Impianti di potabilizzazione, sterilizzazione e disinquinamento dell'acqua.				X
Industria cartotecnica.	X			
Industria dei prodotti chimici inorganici ed organici.	X			X
Industria dei prodotti tossici e corrosivi.	X			
Industria petrolchimica.	X			X
Laboratori di analisi.				X
Lavorazione della gomma greggia.	X			X
Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti.		X		X
Lavori di palificazioni, sondaggi, trivellazioni. Fondazioni speciali.				X
Magazzini.				X
Personale addetto a centri di elaborazione dati, a centralini telefonici, a sportelli informatizzati, a registratori di cassa.				X
Produzione di gas compressi.				X
Produzione di gomma sintetica.	X			
Produzione di inchiostri, gomma arabica, colle, prodotti per tipografie.	X			
Produzione di polimeri sintetici ed artificiali.	X			
Saline, raccolta e raffinazione del sale marino.				X
Servizi generali dell'industria petrolchimica.				X

## Note

Restrizioni e limiti - La sostanza &grave; oggetto del DPR 10/9/1982 n&deg; 962 relativo a: "Attuazione della Direttiva CEE n&deg; 78/610/CEE relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori esposti a cloruro di vinile monomero". (G.U. n&deg; 5 del 6 gennaio 1983) La CEE associa alla classificazione la seguente nota: NOTA D: Talune sostanze che tendono spontaneamente alla polimerizzazione o decomposizione si riscontrano generalmente sul mercato sotto forma stabilizzata. &grave; appunto sotto questa forma che sono elencate nell'allegato I della presente direttiva. Tuttavia, tali sostanze sono a volte immesse in commercio sotto forma non stabilizzata. In questo caso, il fabbricante o qualsiasi altra persona che le immette in commercio deve specificare sull'etichetta il nome della sostanza seguito dalla dicitura "non stabilizzata". Esempio: acido metacrilico (non stabilizzato).

## Valori Limite di Soglia

8h-TWA: 2,6 mg/m<sup>3</sup> (1 ppm) (D.Lgs. 4/9/2024 n. 135 - Attuazione Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio. All. XLIII) TWA 1 ppm A1 Lung cancer; liver dam (ACGIH)

## Riferimenti bibliografici

Monografie IARC Vol. 7 (1974); Vol. 19 (1979); Suppl. 7 (1987); Vol. 97 (2008); Vol 100 parte F (2012). Hazardous Substances Data Bank ([HSDB](#)).

American Conference of Governmental Industrial Hygienists. Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices. Cincinnati, OH 2019. &nbsp; &nbsp;

**Ultima Modifica**

17/02/2026

Stampata da MATline (<https://www.matline.dors.it/matrice>) il 07/06/2026