Polvere di cuoio

Ultimo aggiornamento
17/02/2026

CLASSE IARC
1

Sinonimi

Leather dust.

Organi bersaglio

C'è una forte evidenza che l'esposizione a polveri di cuoio provochi il cancro delle cavità nasali e paranasali. Numerosi studi epidemiologici descrittivi e caso-controllo hanno evidenziato un eccesso di rischio per tumori delle cavità nasali e dei seni paranasali tra i lavoratori dell'insustria calzaturiera. Gli studi che prevedevano una classificazione istologica dei tumori hanno messo in evidenza eccessi di rischio significativi per adenocarcinoma delle cavità nasali e dei seni paranasali.

EVIDENZA SUFFICIENTE	EVIDENZA LIMITATA
• Cavità naso-sinusali	–

Elenco lavorazioni collegate

LAVORAZIONI	LETTERATURA	CAMPIONAMENTI	REGISTRI DI PATOLOGIA	SIREP
Autisti.				●
Confezione di abbigliamento, accessori, biancheria e articoli per arredamento.	●		●	●
Confezione di calzature.	●		●	●
Conservazione, concia, preparazione, trattamento e rifinitura di pelli e cuoi.	●		●	●
Costruzione di autoveicoli, rimorchi, autobetoniere, carrelli industriali, motocicli, ciclomotori, biciclette.			●	
Fabbricazione di accessori per l'abbigliamento.				●
Lavorazione di pelli e cuoi naturali.	●		●	
Personale addetto a centri di elaborazione dati, a centralini telefonici, a sportelli informatizzati, a registratori di cassa.				●
Produzione di tavolette per pavimenti, perline per rivestimenti, cornici, attrezzi ginnici e sportivi.			●	

Riferimenti bibliografici

Monografie IARC Vol. 25 (1981); Vol. 100 - Parte C (2012).

Documentazione Regionale Salute

Centro di Documentazione per la Promozione della Salute

Via Sabaudia, 164 – 10095 Grugliasco (TO) · Tel. 011 40188210-502 · Fax 011 40188201 · info@dors.it