

Formula bruta	Famiglia chimica	Codice CAS	Classe IARC	Codice EINECS
C12-H21-N2-O3-P-S	Composti organofosforici	333-41-5	2A	206-373-8

### Denominazione

Diazinone

### Sinonimi

dietossi-[(2-isopropil-6-metil-4-pirimidinil)ossi]-tiossofosforano; 4-Pyrimidinol; 2-isopropyl-6-methyl-, ; O-ester with O,O-diethyl phosphorothioate; AG-500; Alfa-tox; Antigal; Bassadinon; Basudin; Basudin 10 G; Basudin S; Bazuden; Ciazinon; Compass; Compass (insecticide); Cooper's Flystrike Powder; Dacutox; Dassitox

### Classificazione CE (CLP n.1272/2008)

### Organi Bersaglio

Vi è un'evidenza limitata per la cancerogenicità della sostanza nell'uomo. È stata riscontrata un'associazione positiva per il linfoma non-Hodgkin, con l'indicazione di un trend dose-risposta in due ampi studi multicentrici caso-controllo. Lo studio di coorte Agricultural Health Study (AHS) riferisce un'associazione positiva con sottotipi specifici che persiste anche dopo l'aggiustamento per l'esposizione ad altri pesticidi. Alcuni aggiornamenti dallo studio AHS mostrano un aumento di rischio del tumore al polmone con una relazione dose-risposta che non può essere spiegata dal confondimento con altre esposizioni. Nei roditori, la sostanza aumenta il carcinoma epatocellulare nei topi e leucemia o linfoma (combinati) nei ratti, ma solo nei maschi che hanno ricevuto basse dosi della sostanza in ognuno degli studi. Diazinon induce un danno ai cromosomi e al DNA nei roditori e nelle cellule umane e di mammiferi in vitro.

### Utilizzo

Insetticida organo fosforico usato in passato per il controllo di insetti in ambiente domestico (blatte, pulci, formiche). L'uso in ambiente domestico è stato vietato in Europa e negli Stati Uniti, è ancora consentito l'uso in agricoltura per eliminare insetti dal fogliame e dal suolo e infestanti da numerosi alberi da frutto, verdure e piante ornamentali.

### Elenco lavorazioni collegate

Lavorazioni	Letteratura	Campionamenti	Reg. patologie	SIREP
Coltivazione, raccolta e prima lavorazione dei prodotti colturali.	X			
Industria farmaceutica.	X			
Lavorazione del terreno.	X			
Lavorazioni agricole particolari.	X			
Produzione di prodotti fitosanitari.	X			
Servizi di sterilizzazione, disinfestazione e derattizzazione.	X			

**Valori Limite di Soglia**

TWA 0.01 mg/m<sup>3</sup> (IFV) Skin; A4; BEIA Cholinesterase inhib

Appartenente alla classe degli antiparassitari inibitori della acetilcolinesterasi: attività colinesterasica nei globuli rossi: 70% della linea di base individuale.

**Riferimenti bibliografici**

Monografie IARC Vol 112 (2015) American Conference of Governmental Industrial Hygienists. Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices. Cincinnati, OH 2019.

**Ultima Modifica**

17/02/2026