Antimonio tricloruro

Ultimo aggiornamento
30/03/2026

CODICE CAS	NUMERO EINECS	CLASSE IARC
10025-91-9	233-047-2	2A
FORMULA BRUTA	**FAMIGLIA CHIMICA**	**CLASSIFICAZIONE CLP**
SbCl3	Composti dell'antimonio	dati ECHA

Sinonimi

Antimony trichloride; Antimonio(III) Cloruro; Stibium chloride; TRICHLOROSTIBINE; BUTTER OF ANTIMONY; antimony(3+) trichloride; ANTIMON(III)-CHLORID.

Organi bersaglio

Le evidenze epidemiologiche sull'associazione tra esposizione ad antimonio e tumori nell'uomo derivano principalmente da studi occupazionali su lavoratori di fonderie. I risultati più solidi riguardano il cancro del polmone, per il quale è stata osservata in modo coerente un'aumentata mortalità tra i lavoratori esposti, con un possibile effetto dose–risposta legato alla durata del lavoro o all'esposizione cumulativa.

Tuttavia, l'interpretazione di questi risultati è limitata dalla difficoltà di controllare il confondimento da arsenico, un noto cancerogeno presente negli stessi contesti industriali. Sebbene gli studi suggeriscano che l'arsenico non spieghi completamente le associazioni osservate, il suo ruolo non può essere escluso. Le evidenze relative ad altri tumori sono scarse e non conclusive. Inoltre, gli studi epidemiologici non distinguono adeguatamente tra le diverse forme chimiche dell'antimonio e mancano dati specifici sull'antimonio pentavalente.

Negli animali da esperimento, esistono evidenze più solide: l'ossido di antimonio(III), somministrato per inalazione, ha determinato un aumento dell'incidenza di diversi tumori in più specie (topi e ratti), in particolare a carico del polmone, ma anche della cute, del sistema ematolinfopoietico e della midollare surrenale.

Utilizzi della sostanza

La sostanza viene usata come catalizzatore nell'industria chimica e come intermedio nella produzione di pigmenti inorganici

Elenco lavorazioni collegate

LAVORAZIONI	LETTERATURA	CAMPIONAMENTI	REGISTRI DI PATOLOGIA	SIREP
Industria dei prodotti chimici inorganici ed organici.	●			

LAVORAZIONI	LETTERATURA	CAMPIONAMENTI	REGISTRI DI PATOLOGIA	SIREP
Produzione di coloranti e colori.	●			

Valori Limite di Soglia

TWA 0,5 mg/m³ (ACGIH)

TWA 0,5 mg/m³(OSHA, NIOSH)

Riferimenti bibliografici

Monografia IARC, Volume 131 (2023); Echa Chemical Database Antimony trichloride 100.030.031 | Overview - ECHA CHEM

MATline

Documentazione Regionale Salute

Centro di Documentazione per la Promozione della Salute

Via Sabaudia, 164 – 10095 Grugliasco (TO) · Tel. 011 40188210-502 · Fax 011 40188201 · info@dors.it

dors Centro Regionale di Documentazione per la Promozione della Salute

REGIONE PIEMONTE